



Биостим Старт

Эко Плюс

аминокислоты, полисахариды, макро- и микроэлементы

Жидкое аминокислотное удобрение-биостимулятор для предпосевной обработки семян и посадочного материала, а также для корневых подкормок рассады

Доступно в следующих странах: Россия, Азербайджан, Алжир, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан

Преимущества:

- Активатор энергии и стимулятор прорастания семян
- Более ранние и дружные всходы
- Ускоренное формирование корневой системы
- Улучшение приживаемости рассады и минимизация послепересадочных стрессов

Регламент применения

Культура	Способ, время, особенности применения	Норма расхода препарата, л/га (т)	Норма расхода рабочей жидкости, л/га (т)
Зерновые, зернобобовые, кормовые, технические, масличные культуры	Предпосевная обработка семян	0,5-1,2	5-10
Картофель	Предпосадочная обработка клубней	0,6-0,8	30
	Корневая подкормка в фазе полных всходов и далее 1-2 раза с интервалом 7-10 дней	1,0-5,0	в зависимости от нормы и системы полива
Овощные, цветочно-декоративные культуры	Замачивание семян перед посевом на 10-20 минут с последующей просушкой, луковиц и клубнелуковиц перед посадкой - на 24 часа	10-20 мл/кг	1,5-2,0 л/кг
	Корневая подкормка рассады на 3-4 день после посева и через 3-5 дней после всходов	0,5-3,0 мл/м ²	до равномерного увлажнения земляного кома или 2-3 л/м ²
	При пересадке рассады. Погружение кассет до промачивания кома или полив непосредственно перед высадкой	1 л/100 л воды	до равномерного увлажнения земляного кома или 2-3 л/м ²

Овощные культуры	Корневая подкормка через 3-5 дней после всходов или сразу после высадки рассады, далее 1-2 раза с интервалом 7-10 дней	1,0-5,0	в зависимости от нормы и системы полива
Цветочно-декоративные культуры	Корневая подкормка через 3-5 дней после всходов или сразу после высадки рассады, далее 1-2 раза с интервалом 7-10 дней, затем после каждой срезки	1,0-5,0	в зависимости от нормы и системы полива
Ягодные культуры (рассада, саженцы)	Корневая подкормка на 3-4 день после полива (посадки) и через 10-15 дней	0,05-0,3 л/м ²	в зависимости от нормы и системы полива
Ягодные культуры	Корневая подкормка весной при возобновлении вегетации или сразу после высадки саженцев и затем 1-2 раза с интервалом 7-10 дней	1,0-5,0	в зависимости от нормы и системы полива
Плодовые деревья, виноградники, декоративные деревья и кустарники	Корневая подкормка в период распускания листьев и далее 1-3 раза с интервалом 7-10 дней	2,0-7,0	в зависимости от нормы и системы полива

Общая информация

Состав аминокислотного биостимулятора Биостим Старт

Состав

%

г/л

Свободные аминокислоты растительного происхождения	5,5	71,5
Полисахариды	7,0	91,0
Азот (N) общ.	4,5	58,5
Фосфор (P ₂ O ₅)	5,0	65,0
Калий (K ₂ O)	2,5	32,5
Магний (MgO)	1,0	13,0
Марганец (Mn)	0,2	2,6
Цинк (Zn)	0,2	2,6
Медь (Cu)	0,1	1,3
Бор (B)	0,1	1,3
Молибден (Mo)	0,01	0,13

Предназначен для предпосевной (предпосадочной) обработки семян зерновых, зернобобовых, технических, масличных овощных, цветочно-декоративных культур, предпосадочной обработки клубней картофеля, а также для корневых подкормок при выращивании и пересадке рассады (саженцев), корневых подкормок ягодных культур, плодовых деревьев, виноградников, декоративных деревьев и кустарников.