



## Азорро, КС

Концентрат суспензии

300 г/л карбендазима + 100 г/л азоксистробина

Уникальный комбинированный фунгицид для защиты посевов зерновых культур в ранневесенний период, а также посевов сои и сахарной свеклы.

Доступно в следующих странах: Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Узбекистан

## Преимущества:

- Усиленное фунгицидное действие против заболеваний благодаря уникальной комбинации активных компонентов
- Уничтожение инфекции в прикорневой зоне и листовых болезней раннего развития
- Длительное профилактическое действие против листовых заболеваний
- Особенно рекомендован для первой фунгицидной обработки озимых зерновых в ранневесенний период
- Эффект "зеленого листа" и "антистресс"
- Формирование зерна высокого качества

# Действие препарата

## Механизм действия

??????????? обладает защитным и лечащим действием. Действующее вещество поглощается листьями и корнями с преимущественным перемещением вверх. Тормозит процесс деления клеток патогенов. Системное действие позволяет защищать даже те участки больных растений, с которыми препарат не соприкасается. Благодаря лечебному (куративному) действию, фунгицид эффективно подавляет болезни даже после проявления их симптомов на растении.

??????????????? обладает системным и контактным действием с защитным и лечащим эффектом. Механизм действия обусловлен способностью вещества подавлять митохондриальное дыхание клеток патогенов, что приводит их к быстрой гибели.

## Период защитного действия

Совокупный период защиты составляет 4 недели с момента обработки. Период защитного действия карбендазима длится до 3-х недель. Защитное действие азоксистробина проявляется в течение 4-х недель с момента обработки.

## Скорость воздействия

Обеспечивает защитное и антиспорულიрующее действие сразу же после контакта препарата с обрабатываемой листовой поверхностью.

# Регламент применения

| Культура | Вредный объект | Норма расхода<br>препарата,<br>л/га | Норма расхода<br>рабочей<br>жидкости, л/га | Способ, время, особенности<br>применения препарата | Сроки<br>ожидания<br>(кратность<br>обработок) |
|----------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|          |                |                                     |                                            |                                                    |                                               |

|                              |                                                                                         |         |         |                                                                                                                                 |         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Пшеница<br>озимая            | Мучнистая роса, ржавчина<br>бурая, септориоз листьев,<br>пиренофороз,<br>церкоспореллез | 0,8-1,0 | 200-300 | Опрыскивание в период<br>вегетации                                                                                              | 40(1-2) |
| Пшеница<br>яровая            | Мучнистая роса, ржавчина<br>бурая, пиренофороз,<br>септориоз листьев                    | 0,8-1,0 |         |                                                                                                                                 |         |
| Ячмень<br>яровой и<br>озимый | Сетчатая пятнистость,<br>темно-бурая пятнистость ,<br>ринхоспориоз                      | 0,8-1,0 |         |                                                                                                                                 |         |
| Соя                          | Аскохитоз, пероноспороз,<br>церкоспороз, септориоз                                      | 0,8-1,0 | 200-400 | Опрыскивание в период<br>вегетации: первое - при<br>появлении первых признаков<br>заболевания, следующее -<br>через 10-14 дней. | 50(1-2) |
| Сахарная<br>свекла           | Церкоспороз, мучнистая<br>роса, фомоз                                                   | 0,6-1,0 |         |                                                                                                                                 |         |

### Технология применения. Порядок приготовления рабочей жидкости

Рабочую жидкость готовить непосредственно перед опрыскиванием. Бак опрыскивателя на 1/2 заполнить водой, залить полную дозу препарата, затем долить оставшееся количество воды и перемешать. Перемешивание продолжается и во время обработки посевов для обеспечения однородности рабочей жидкости.

Приготовление рабочей жидкости и заправку опрыскивателя проводят на специальных площадках, которые в дальнейшем подвергают обезвреживанию.

Для опрыскивания применяются серийно выпускаемые штанговые опрыскиватели, предназначенные для внесения фунгицидов.

#### **Совместимость с другими пестицидами**

Совместим с большинством инсектицидов, гербицидов. Перед широкомасштабным применением необходимо проверять на химическую и биологическую совместимость с конкретным препаратом в рекомендуемых дозах.

#### **Фитотоксичность**

При соблюдении рекомендуемых норм расхода фитотоксичностью не обладает.

Возможность возникновения резистентности

При соблюдении рекомендуемых норм расхода и технологии использования препарата возникновение резистентности не наблюдалось.

## **Общая информация**

#### **Химический класс**

бензимидазолы, стробилурины

#### **Класс опасности**

2 класс опасности, вещество высокоопасное

#### **Гарантийный срок хранения**

3 года

#### **Температурный интервал хранения**

от -10 до + 30 °C

#### **Упаковка**

канистра 10 л

#### **Регистрант**

АО «Щелково Агрохим», Россия

#### **Изготовитель**

АО «Щелково Агрохим», Россия