

Галс Супер, СЭ

Суспензионная эмульсия

250 г/л метазахлора + 33 г/л кломазона

Высокоэффективный довсходовый гербицид для борьбы с широким спектром сорняков в посевах рапса.

Доступно в следующих странах: Беларусь

Преимущества:

- Широкий спектр действия благодаря наличию 2-х системных гербицидных компонентов разного механизма действия
- Отличная эффективность против проблемных видов сорняков и устойчивых к другим группам гербицидов
- Защита от сорной растительности на весь вегетационный период
- Действует на прорастающие сорняки даже через 30-45 дней после внесения
- Быстрое действие и визуальный эффект через несколько дней после применения

Действие препарата

Механизм действия

Препарат системного действия. Он проникает в растение через корневую систему, побеги, листья.

Гербицидное действие проявляется в нарушении физиологии корня и блокировании процесса фотосинтеза. Первые признаки обнаруживаются в торможении транспирации и роста корня. В результате сорняки приостанавливаются в росте, приобретают хлоротичную окраску и засыхают. По механизму действия относится к ингибиторам синтеза пигментов.

Период защитного действия

Обеспечивает защитное действие в течение всего вегетационного периода.

Скорость воздействия

При дождевом применении гибель сорняков наступает через несколько дней после их всходов.

Совместимость с другими пестицидами

Совместим с большинством пестицидов, которые обычно используются на рапсе в те же сроки. Перед широкомасштабным применением необходимо проверять на физико-химическую совместимость смешиваемых компонентов.

Особенности применения препарата

Для достижения максимального эффекта необходима качественная предпосевная обработка почвы (отсутствие комков, выровненная поверхность поля). Опрыскивание почвы проводить сразу после посева, желательно не позднее 30-36 часов после посева. Норма расхода зависит от содержания гумуса в почве. На малогумусных почвах следует использовать минимальную рекомендованную норму.

При повышенной почвенной влажности на малогумусных почвах возможно кратковременное побеление листьев рапса. Данный эффект исчезает через месяц и не оказывает отрицательного влияния на итоговую урожайность и качество продукции.

Спектр действия

Злаковые и двудольные сорняки, в т. ч. подмаренник цепкий, торица полевая, виды ромашки, сорняки семейства капустные (редька дикая, озимая сурепица, ярутка полевая, пастушья сумка и др.).

Общая информация

Химический класс

хлорацетомины, производные изоксазолидинона

Класс опасности

3 класс опасности, вещество умеренно опасное

Гарантийный срок хранения

2 года

Температурный интервал хранения

от -10°C до +30 °C

Упаковка

канистра 5 л, 10 л

Изготовитель

АО «Щелково Агрохим», Россия

Регистрант

АО «Щелково Агрохим», Россия